

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

физический факультет

Квантовая теория (II поток) январь 2011 г.

<http://hep.phys.msu.ru>

Теоретические вопросы

Стационарная теория возмущений

1. Стационарная теория возмущений, случай невырожденного уровня. Условия применимости.
2. Стационарная теория возмущений, случай вырожденного уровня. Теория возмущений для близких уровней.

Многоэлектронный атом

3. Тождественные частицы. Принцип неразличимости. Бозоны и фермионы. Базис в пространстве состояний тождественных частиц. Принцип Паули.
4. Многоэлектронный атом, приближение центрального поля, интегралы движения, конфигурация, термы.
5. Построение явного вида волновых функций термов, старшие вектора.
6. Диаграммы Юнга. 1-е и 2-е правила Хунда, их объяснение.
7. Тонкая структура термов. 3-е правило Хунда, его доказательство.
8. Метод Хартри. Метод Хартри-Фока. Таблица Менделеева.
9. Типы химической связи. Вид волновой функции для иона водорода. Вид волновой функции для атома водорода. Классификация термов в двухатомной молекуле. Структура термов.

Теория рассеяния

10. Упругое потенциальное рассеяние. Постановка задачи. Борновский ряд, условие сходимости, условие применимости 1-го борновского приближения.
11. Парциальное разложение. Условие унитарности для парциальных амплитуд рассеяния, фаза рассеяния. Оптическая теорема, ее физический смысл.
12. Дискретные уровни, виртуальные уровни, метастабильные уровни. Физический смысл метастабильного уровня. Метастабильный уровень и резонанс в рассеянии.
13. Рассеяние при низких энергиях, резонансы в рассеянии при низких энергиях.
14. Рассеяние при высоких энергиях. Формула для амплитуды рассеяния в приближении эйконала как формула парциального разложения.

Теория переходов

15. Представление Дирака. Нестационарная теория возмущений. Переходы мгновенные и адиабатические.
16. Переходы под действием периодического возмущения. Золотое правило Ферми.
17. Функция Грина системы и эволюция состояния. Дискретный и непрерывный спектр системы и функция Грина. Уравнения для функции Грина системы при наличии возмущения.
18. Приближенное решение уравнений для функции Грина системы при наличии возмущения. Превращение дискретного уровня в метастабильный. Закон распада метастабильного уровня и форма линии.
19. S-матрица, ее свойства. T-матрица (матрица реакций). Оптическая теорема для T-матрицы.

Вторичное квантование

20. Вторичное квантование. Коммутационные соотношения для операторов рождения-уничтожения. Фоковское пространство. Базис в Фоковском пространстве.
21. Оператор волновой функции. Операторы в представлении вторичного квантования. Гамильтониан и оператор числа частиц.

Квантование электромагнитного поля

22. Квантование электромагнитного поля. Коммутационные соотношения для операторов рождения-уничтожения фотонов. Энергия и импульс поля.
23. Излучение. Связь между коэффициентами Эйнштейна.
24. Мультипольное разложение. Электрическое дипольное излучение.

Уравнение Дирака

25. Уравнение Дирака. Решения свободного уравнения Дирака с определенным импульсом и спиральностью.
26. Спин частицы Дирака. Уравнение Паули.

Задачи

1. Заряженный двумерный симметричный линейный гармонический осциллятор помещен в слабое однородное магнитное поле, ориентированное по оси z . В первом порядке теории возмущений найти поправки к энергии второго возбужденного уровня $E^{(0)} = 3\hbar\omega$, вызванные магнитным полем.
2. Двумерный симметричный линейный гармонический осциллятор. В первом порядке теории возмущений найти поправки к энергии первого возбужденного уровня $E^{(0)} = 2\hbar\omega$, вызванные возмущением $H_I = \alpha xy$. Сравнить с точным ответом.
3. Найти диэлектрическую восприимчивость газа, состоящего из атомов водорода, находящихся в основном состоянии. Спином пренебречь.
4. Найти магнитную восприимчивость газа, состоящего из атомов водорода, находящихся в основном состоянии. Спином пренебречь.
5. Найти энергию взаимодействия двух атомов водорода на больших расстояниях (силы Ван-дер-Ваальса).
6. Найти расщепление уровня $n = 2$ атома водорода в слабом магнитном поле с учетом тонкой структуры.
7. Найти расщепление уровня $n = 2$ атома водорода в среднем магнитном поле с учетом тонкой структуры.
8. Найти расщепление уровня $n = 2$ атома водорода в сильном магнитном поле с учетом тонкой структуры.
9. Найти расщепление уровня $n = 2$ атома водорода в слабом электрическом поле с учетом тонкой структуры.
10. Найти расщепление уровня $n = 2$ атома водорода в среднем электрическом поле с учетом тонкой структуры.
11. Найти расщепление уровня $n = 2$ атома водорода в сильном электрическом поле с учетом тонкой структуры.
12. Разложить электронную конфигурацию $2p^3$ на термы с помощью диаграмм Юнга.
13. Разложить электронную конфигурацию $3d^2$ на термы с помощью диаграмм Юнга.
14. Разложить электронную конфигурацию $3d^3$ на термы с помощью диаграмм Юнга.
15. Найти явный вид волновых функций термов в конфигурации $2p^3$.
16. Найти явный вид волновых функций термов в конфигурации $2p^4$.

17. Найти явный вид волновых функций старших векторов термов в конфигурации $3d^2$.
18. Пользуясь правилами Хунда, найти квантовые числа S, L, J состояния с наименьшей энергией для конфигурации nl^k .
19. Найти поправки к уровням энергии многоэлектронного атома в слабом однородном магнитном поле.
20. Найти поправки к уровням энергии многоэлектронного атома в сильном однородном магнитном поле.
21. Найти поправки к уровням энергии многоэлектронного атома в слабом однородном электрическом поле.
22. На атоме водорода, находящемся в основном состоянии, рассеиваются μ -мезоны. Найти формфактор и дифференциальное сечение упругого рассеяния.
23. На равномерно заряженном шаре с плотностью заряда ρ рассеиваются заряженные частицы с зарядом q . Найти формфактор и дифференциальное сечение упругого рассеяния.
24. Определить полное сечение упругого рассеяния непроницаемой сферой радиуса a для быстрых частиц, де-бройлевская длина волны которых $\lambda \ll a$.
25. Определить полное сечение упругого рассеяния непроницаемой сферой радиуса a для медленных частиц, де-бройлевская длина волны которых $\lambda \gg a$.
26. Найти энергию и время жизни метастабильных s -уровней в потенциале $V(r) = V_0 \delta(r-a)$.
27. Найти энергию и время жизни метастабильных уровней в одномерном потенциале $V(r) = V_0 \delta(x-a) + V_0 \delta(x+a)$.
28. Найти энергию и время жизни метастабильных уровней в одномерном потенциале $V(r) = U_0 \theta(a-|x|) - V_0 \delta(x)$
($\theta(x) = 1$ при $x > 0$ и $\theta(x) = 0$ при $x < 0$).
29. Найти парциальное сечение рассеяние s -волны на потенциале $V(r) = V_0 \delta(r-a)$. Указать положение резонансов.
30. Вычислить сечение упругого рассеяния медленной частицы на потенциальной яме $V(r < a) = -V_0, V(r > a) = 0$. Указать условие резонанса.
31. В приближении эйконала найти фазы рассеяния на потенциале A/r^2 . Сравнить с точным ответом.
32. Найти фазы рассеяния при упругом рассеянии на потенциале $V(r < a) = A/r^2, V(r > a) = 0$.
33. Найти фазы рассеяния при упругом рассеянии на потенциале $V(r) = -U_0 \theta(a-r) + V_0 \delta(r-a)$
($\theta(x) = 1$ при $x > 0$ и $\theta(x) = 0$ при $x < 0$).
34. Найти дифференциальное сечение упругого кулоновского рассеяния электрона на электро-неоне для синглетного и триплетного состояний в системе центра масс.
35. Найти вероятность того, что электрон в атоме трития H^3 , находящийся в основном состоянии, перейдет в $1s$ состояние иона He^{3+} при β -распаде одного из нейтронов ядра.
36. Найти дифференциальное сечение неупругого рассеяния частицы на сферическом гармоническом осцилляторе. Осциллятор переходит из основного в первое возбужденное состояние $|001\rangle$. Потенциал взаимодействия между частицей и осциллятором $W(\vec{x}, \vec{y}) = W_0 \delta(\vec{x} - \vec{y})$.
37. Найти дифференциальное сечение неупругого рассеяния μ -мезона на неподвижном атоме водорода. Атом переходит из состояния $1s$ в состояние $2s$.
38. Найти средние значения и дисперсию напряженностей электрического и магнитного полей в одномодовом когерентном состоянии $|\alpha_{\vec{k}, p}\rangle$.

39. Найти средние значения и дисперсию напряженностей электрического и магнитного полей в двухмодовом когерентном состоянии $|\alpha_{\vec{k}_1, p_1}, \beta_{\vec{k}_2, p_2}\rangle$.
40. Найти средние значения и дисперсию напряженностей электрического и магнитного полей в состоянии $|\psi\rangle = |\alpha_{\vec{k}_1, p_1}\rangle/\sqrt{2} + |\beta_{\vec{k}_2, p_2}\rangle/\sqrt{2}$.
41. Вывести формулу для распределения интенсивности излучения по углам и поляризациям в электрическом дипольном приближении.
42. Вывести формулу для распределения интенсивности излучения по углам и поляризациям в электрическом квадрупольном и магнитном дипольном приближении.
43. Указать, между какими уровнями заряженного сферического гармонического осциллятора возможны электромагнитные переходы в дипольном приближении. Вычислить время жизни первого возбужденного уровня осциллятора в этом приближении. Найти распределения интенсивности излучения по углам и поляризациям.
44. В дипольном приближении вычислить время жизни уровня $2p_{1/2}$ атома водорода (с учетом тонкой структуры).
45. В дипольном приближении вычислить время жизни уровня $2p_{3/2}$ атома водорода (с учетом тонкой структуры).
46. Атом водорода помещен в слабое однородное магнитное поле. Описать излучение при переходе $3d \rightarrow 2p$ (тонкой структурой пренебречь). Указать количество линий в спектре и описать распределение их интенсивности по углам и поляризациям.
47. Частица со спином $1/2$ находится в однородном магнитном поле напряженности \vec{H} . Найти время жизни возбужденного состояния и распределение интенсивности излучения по углам и поляризациям.
48. Найти время жизни и распределение интенсивности излучения по углам и поляризациям при переходе между уровнями сверхтонкой структура атома водорода.
49. Доказать, что однофотонные переходы $S \rightarrow S$ запрещены во всех порядках мультипольности.
50. Найти закон дисперсии магнона для спиновой цепочки с гамильтонианом
$$H = -\alpha \sum \vec{s}_n \vec{s}_{n+1} - \beta \sum \vec{s}_n \vec{s}_{n+2} - 2\mu_0 \vec{H} \sum \vec{s}_n$$